

הצגות של חבורות סופיות

© ארזים

17 בנובמבר 2016

1 תורת הכרקטרים

1.1 אורתוגונליות של כרקטרים

הגדרה 1.1 סימון עבור שתי פונקציות ϕ, ψ מחבורה G מסדר g אל \mathbb{C} , נגדיר

$$\langle \phi, \psi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \phi(t) \psi(t^{-1})$$

זוהי תבנית בי לינארית סימטרית. מלמת שור, אם ρ^1, ρ^2 שתי הצגות אי פריקות לא איזומורפיות של G , בהנחה שהמטריצה של ρ^1 היא (r_{i_1, j_1}) והמטריצה של ρ^2 היא (r_{i_2, j_2}) , אזי

$$\langle r_{i_2, j_2}, r_{j_1, i_1} \rangle = 0$$

ואם $\rho^1 = \rho^2$ מתקיים

$$\langle r_{i_2, j_2}, r_{j_1, i_1} \rangle = \frac{1}{n} \delta_{i_1, i_2} \delta_{j_1, j_2}$$

ראינו כל זאת בשיעור הקודם. כעת נגדיר

$$(\phi, \psi) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \phi(t) \overline{\psi(t)}$$

ראינו שלכל הצגה קיימת מכפלה פנימית אינווריאנטית בשיעור הראשון, על ידי ממוצע. על ידי לקיחת בסיס אורתונורמלי, נקבל שהמטריצה $r_{i, j}$ אוניטרית, כלומר

$$r_{j, i}(t) = \overline{r_{i, j}(t)}$$

נשים לב כי (\cdot, \cdot) היא מכפלה פנימית מעל \mathbb{C} . כעת נקבל כי אם ρ^1, ρ^2 הצגות אוניטריות אי פריקות לא איזומורפיות, אזי

$$(r_{i_1, j_1}, r_{i_2, j_2}) = 0$$

לעומת זאת אם $\rho^1 = \rho^2 = \rho$ הצגה אוניטרית אי פריקה עם מטריצה $(r_{i,j})$ אזי

$$(r_{i_1, j_1}, r_{i_2, j_2}) = \frac{1}{n} \delta_{i_1, i_2} \delta_{j_1, j_2}$$

משפט 1.2 1. אם כרקטר של הצגה אי פריקה, אזי $(\chi, \chi) = 1$.

2. אם χ, χ' כרקטרים של שתי הצגות אי פריקות לא איזומורפיות, אזי $(\chi, \chi') = 0$.

הוכחה:

1.

$$(\chi, \chi) = \left(\sum_i r_{i,i}, \sum_j r_{j,j} \right) = \sum_{i,j} (r_{i,i}, r_{j,j}) = \sum_{i,j} \frac{1}{n} \delta_{i,j} = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

2.

$$(\chi, \chi') = \left(\sum_{i_1} r_{i_1, i_1}, \sum_{i_2} r_{i_2, i_2} \right) = \sum_{i_1, i_2} (r_{i_1, i_1}, r_{i_2, i_2}) = 0$$

משפט 1.3 תהי V הצגה לינארית של G עם כרקטר χ . נניח כי V מתפרק לסכום ישר של העתקות אי פריקות:

$$V = \bigoplus_{i=1}^k W_i$$

בנוסף, תהי W הצגה אי פריקה עם כרקטר χ . אזי מספר ההצגות W_i שאיזומורפיות להצגה W הוא בדיוק (ϕ, χ) .

הוכחה: נסמן $\chi_i = \text{char}(W_i)$. אם כן נקבל

$$(\phi, \chi) = \sum_i (\chi_i, \chi) = |\{i \mid (\chi_i, \chi) = 1\}| = |\{i \mid W \cong W_i\}|$$

מסקנה 1.4 כמות ההצגות W_i שאיזומורפיות להצגה W אינה תלויה בפירוק.

מסקנה 1.5 שתי הצגות עם אותו כרקטר הן איזומורפיות.

נשים לב כי מרחב הפונקציות $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ הוא ממימד $|G|$, וכן כל שני כרקטרים הם אורתוגונליים - לכן יש לכל היותר $|G|$ הצגות אי פריקות לא איזומורפיות. בפרט מספר זה סופי.

יהיו W_1, \dots, W_h ההצגות האי פריקות של G , ויהיו χ_1, \dots, χ_h הכרקטרים שלהם (כרקטר של הצגה אי פריקה ייקרא כרקטר אי פריק). כל הצגה V של G איזומורפית לסכום הישר $m_1 W_1 \oplus \dots \oplus m_h W_h$ עבור שלמים m_1, \dots, m_h כלשהם. הכרקטר ϕ של V היא כמובן $\sum m_i \chi_i$. כעת מתקיים

$$(\phi, \phi) = \sum_{i=1}^h m_i^2$$

שכן הכרקטרים אורתוגונליים.

משפט 1.6 אם ϕ הכרקטר של הצגה $V \neq 0$, אזי (ϕ, ϕ) הוא שלם וחיובי, וכן $(\phi, \phi) = 1$ אם ורק אם V אי פריקה.

הוכחה: ראינו כי $(\phi, \phi) = \sum m_i^2$ עבור שלמים m_i , ולכן ברור כי זהו שלם חיובי. הוא שווה לאחד אם ורק אם $m_i = 1$ עבור i מסויים ולכל $j \neq i$ מתקיים $m_j = 0$, כלומר $V \cong W_i$. ■

1.2 הפירוק של ההצגה הרגולרית

יהיו χ_1, \dots, χ_n הכרקטרים האי פריקים של G , מסדר g . נסמן $n_i = \chi_i(1)$. תהי $\{e_t\}_{t \in G}$ קבוצת איברים. נגדיר את ההצגה הרגולרית R :

$$\rho_s e_t = e_{st}$$

כמובן, לכל $s \neq 1$ מתקיים $st \neq t$ לכל t . לכן לכל $s \neq 1$, $\text{tr}(\rho_s) = r_G(s) = 0$, כאשר r_G הכרקטר של R . כמו כן, $r_G(1) = \text{tr}(I_g) = g$. קיבלנו טריוויאלית את הטענה הבאה:

טענה 1.7 הכרקטר r_G של R הוא

$$r_G(t) = \begin{cases} g & t = 1 \\ 0 & t \neq 1 \end{cases}$$

מסקנה 1.8 כל הצגה אי פריקה W_i מופיעה בפירוק ההצגה הרגולרית עם ריבוי השווה למימד שלה, n_i .

הוכחה: ממשפט שראינו, הריבוי של W_i הוא

$$(r_G, \chi_i) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} r_G(t^{-1}) \chi_i(t) = \frac{1}{g} \cdot g \cdot \chi_i(1) = \chi_i(1) = n_i$$

■

מסקנה 1.9 1. המימדים n_i מקיימים

$$\sum_i n_i^2 = g$$

2. אם $s \in G$ אזי

$$\sum_i n_i \chi_i(s) = 0$$

הוכחה: נוכיח את שני הסעיפים יחד. לכל $s \in G$, מתקיים

$$r_G(s) = \sum n_i \chi_i(s)$$

אם $s = 1$, אזי

$$g = r_G(s) = \sum n_i n_i = \sum n_i^2$$

אם $s \neq 1$, אזי

$$0 = r_G(s) = \sum n_i \chi_i(s)$$

■

הערה 1.10 נניח כי בידינו הצגות אי פריקות של G , W_1, \dots, W_n . תנאי הכרחי ומספיק לכך שהן כל ההצגות האי פריקות הוא שסכום ריבועי מימדיהן הוא $|G|$.

1.3 כמות ההצגות האי פריקות של חבורה

הגדרה 1.11 פונקציה $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ נקראת פונקציית מחלקות אם לכל $t, s \in G$ מתקיים

$$f(tst^{-1}) = f(s)$$

אם נסמן בתור H את מרחב פונקציות המחלקות של G , אזי בבירור הוא ממימד שווה לכמות מחלקות הצמידות.

טענה 1.12 תהי f פונקציית מחלקות על G , חבורה מסדר g . תהי $\rho : G \rightarrow GL(V)$ הצגה לינארית של G . נגדיר העתקה לינארית על V :

$$\rho_f = \sum_{t \in G} f(t) \rho_t$$

אם הצגה אי פריקה ממעלה n עם כרקטר χ , אזי ρ_f היא הומומורפיזם מהצורה $\lambda \cdot \text{Id}_V$, עבור

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum f(t) \chi(t) = \frac{g}{n} (f, \bar{\chi})$$

הוכחה: נשתמש בלמת שור. נרצה להראות כי ρ_f הומומורפיזם של הצגות, כלומר

$$\rho_f \rho_s = \rho_s \rho_f$$

נחשב:

$$\rho_s^{-1} \rho_f \rho_s = \sum_{t \in G} f(t) \rho_s^{-1} \rho_t \rho_s = \sum_{t \in G} f(t) \rho_{s^{-1}ts} = \sum_{u \in G} f(sus^{-1}) \rho_u = \sum_{u \in G} f(u) \rho_u = \rho_f$$

ולכן קיבלנו את השוויון שרצינו. לפי למת שור, כל הומומורפיזם של הצגה אי פריקה לעצמה הוא הומומורפיזם. כדי לחשב את הסקלר λ נחשב את העקבה:

$$\lambda n = \text{tr}(\lambda \cdot \text{Id}_V) = \text{tr}(\rho_f) = \sum_{t \in G} f(t) \text{tr}(\rho_t) = \sum_{t \in G} f(t) \chi(t)$$

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{t \in G} f(t) \chi(t) = \frac{g}{n} \frac{1}{g} \sum_{t \in G} f(t) \overline{\chi(t)} = \frac{g}{n} (f, \bar{\chi})$$

■

שוב, נסמן בתור H את מרחב פונקציות המחלקות על G . יהיו χ_1, \dots, χ_h הכרקטרים האי פריקים של G , שבבירור שייכים כולם למרחב H .

משפט 1.13 הם בסיס אורתונורמלי של H .

הוכחה: מספיק להוכיח שהכרקטרים האי פריקים פורשים את H - כבר ראינו שהם אורתונורמליים, ומכאן גם נובעת אי תלות. למעשה, מספיק להראות כי כל איבר של H שאורתוגונלי לכל $\bar{\chi}_i$ הוא 0.

יהי $f \in H$ איבר כזה. בהינתן הצגה הגדרנו את

$$\rho_f = \sum_{t \in G} f(t) \rho_t$$

נובע כי אם ρ אי פריקה, אזי $\rho_f = 0$, שכן

$$\rho_f = \frac{g}{n} (f, \bar{\chi}) \cdot \text{Id}_V$$

ולקחנו f אורתוגונלית לכל $\bar{\chi}$. מהפירוק לאי פריקות, $\rho_f = 0$ לכל הצגה ρ . בפרט זה נכון להצגה הרגולרית R . עבור איבר בסיס פורמלי, ניקח איבר בו e_1 בשביל הצגה הרגולרית, ונקבל

$$\rho_f e_1 = \sum_{t \in G} f(t) \rho_t e_1 = \sum_{t \in G} f(t) e_t = 0$$

■

לכן נובע כי $f(t) = 0$ לכל $t \in G$, כלומר $f = 0$.

משפט 1.14 מספר ההצגות האי פריקות הלא איזומורפיות של חבורה G הוא כמספר מחלקות הצמידות של G .

הוכחה: המרחב H הוא ממימד שהוא מספר מחלקות הצמידות, כפי שכבר ציינו. כמו כן ראינו כי הכרקטרים האי פריקים הם בסיס שלו, כלומר יש אותה כמות מהם. ■

טענה 1.15 יהי $s \in G$, ונסמן בתור $c(s)$ את כמות האיברים במחלקת הצמידות של s .

1.

$$\sum_{i=1}^h \overline{\chi_i(s)} \chi_i(s) = \frac{g}{c(s)}$$

2. עבור $t \in G$ שאינו צמוד של s , מתקיים

$$\sum_{i=1}^n \overline{\chi_i(s)} \chi_i(t)$$

הוכחה: תהי f_s פונקציית המחלקות שמקבלת 1 על מחלקת הצמידות של s , ואפס על כל מחלקה אחרת. ניתן לכתוב

$$f_s = \sum_{i=1}^h \lambda_i \chi_i, \lambda_i = (f_s, \chi_i) = \frac{c(s)}{g} \overline{\chi_i(s)}$$

לכל $t \in G$ מתקבל

$$f_s(t) = \frac{c(s)}{g} \sum_{i=1}^h \overline{\chi_i(s)} \chi_i(t)$$

■ וזה נותן את א' בהצבת $t = s$, ואת ב' אם t אינו צמוד של s .

דוגמא ניקח את S_3 . הגודל $g = 6$. מחלקות הצמידות הן

$$\{1\}, \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}, \{(1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$$

נתבונן בהצגות האי פריקות. בבירור יש את ההצגה הטריטיואלית ממימד 1, ואת הצגת הסימן, גם היא ממימד 1. צריכות להיות 3, כמספר המחלקות, וסכום הריבועים צריך להיות 6 - לכן ההצגה החסרה היא ממימד 2. נסמן $c = (1, 2, 3)$, $t = (1, 2)$. נסמן גם χ_1 הכרקטר של ההצגה הטריטיואלית, χ_2 הכרקטר של הצגת הסימן, ואת θ הכרקטר החסר. כמו כן, r_G יהיה הכרקטר של ההצגה הרגולרית. מתקיים $\chi_1 + \chi_2 + 2\theta = r_G$. כעת, נוכל לחשב:

$$\theta(1) = 2, \theta(t) = 0, \theta(c) = -1$$

וכמובן שאיברים אלה יוצרים את G ולכן זה מספיק. נרצה לבנות הצגה שלה כרקטר θ .

יש הצגה ברורה ממימד 3: מרחב עם בסיס e_1, e_2, e_3 , ופרמוטציות עליו. נסמן את הכרקטר של ההצגה הזו φ . אזי $\varphi(e) = 0$, $\varphi(t) = 1$, $\varphi(1) = 3$. כדי לחשב את כמות הגורמים בה, נחשב

$$(\phi, \phi) = \frac{1}{6} (3^2 + 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0^2) = 2$$

זהו סכום הריבויים בריבוע - לכן ההצגה היא סכום של שתי הצגות אי פריקות, בהכרח. תת הצגה אחת ברורה היא $\mathbb{C}(e_1 + e_2 + e_3)$, ותת הצגה נוספת היא $\{x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$. הכרקטר של הראשונה הוא הטריטיואל, וחישוב פשוט נותן שהכרקטר של השנייה הוא θ .

כעת ניקח הצגה ρ_θ שהכרקטר שלה θ . ההצגה $\rho_\theta \otimes \rho_\theta$ היא ממימד 4, והכרקטר θ^2 . כדי להשיג את הפירוק שלה, נחשב לכל כרקטר אי פרוק χ את הריבוי על ידי (θ^2, χ) . כך נחשב פירוק לפי הכרקטרים. אבל מה אם נרצה למצוא את הפירוק להצגות עצמן?

1.4 הפירוק הקנוני של הצגה

הגדרה 1.16 תהי $\rho : G \rightarrow GL(V)$ הצגה לינארית של G . יהיו χ_1, \dots, χ_h הכרקטרים של W_1, \dots, W_h , ההצגות האי פריקות של G , עם מימדים n_1, \dots, n_h . נכתוב $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_n$ פירוק של V להצגות אי פריקות. נגדיר

$$I_i = \{j \mid U_j \cong W_i\}$$

$$V_i = \bigoplus_{j \in I_i} U_j$$

נגדיר את הפירוק הקנוני של V להיות

$$V = \bigoplus_{i=1}^h V_i$$

משפט 1.17 1. הפירוק הקנוני $V = \bigoplus V_i$ לא תלוי בפירוק המקורי $V = \bigoplus U_i$.

2. ההטלה $p_i : V \rightarrow V_i$ נתונה על ידי נוסחה שתלוייה רק בחבורה G ובהצגה V . בשיעור הבא נכתוב את הנוסחה ונוכיח את המשפט.