

## הצגות של חבורות סופיות

© ארזים

12 בינואר 2017

ראינו בהצאה שאם  $A \triangleleft G$  אבלית אזי  $[G : A]$  מתחלק במימד של כל הצגה אי פריקה של  $G$ .

חבורה  $G$  נקראת סופר פתירה אם ישנה סדרה נורמלית

$$1 = G_0 < G_1 < \dots < G_{n-1} < G = G$$

כך שמתקיים  $G_i \triangleleft G$ , וכן  $G_i/G_{i-1}$  ציקלית. ראינו כי כל הצגה אי פריקה של חבורה סופר פתירה הינה מונומיאלית - מושרית מהצגה ממימד 1. נתבונן בדוגמה (נגדית). נסמן

$$H = \text{Span}_{\mathbb{R}} \{1, i, j, k\}$$

הקוטרניונים הממשיים. נתבונן באיברים ההפיכים  $H^\times$ . נוכל להגדיר הצמדה:

$$(a + bi + cj + dk)^* = a - bi - cj - dk$$

הצמדה הזו היא אנטי הומומורפיזם, כלומר

$$(q_1 q_2)^* = q_2^* q_1^*$$

נגדיר

$$|q| = q \cdot q^*$$

אזי,

$$|q| = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

כאן נקבל

$$|q_1 q_2| = |q_1| |q_2|$$

נשים לב שכל האיברים מהצורה

$$\frac{1}{2} (\pm 1 \pm i \pm j \pm k)$$

לכל בחירת סימנים, הם הפיכים. בנוסף גם  $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k$  הפיכים - וקיבלנו כבר 24 איברים הפיכים. 24 האיברים הללו הם חבורה של הפיכים - קל לחשב ולהיווכח. את תת החבורה הזו נסמן  $G$ . נסמן  $E = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$  - אלה בדיוק האיברים שמקיימים  $q^* = -q$  (וגם  $\pm 1$ ). נקבל כי  $E \triangleleft G$ , על ידי חישוב פשוט. נוכל לכתוב את  $G$  בתור

$$E \rtimes \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

הפעולה על  $E$  היא פרמוטציה בין  $i, j, k$ , כעת, נגדיר את ההומומורפיזם:

$$H \rightarrow M_2(\mathbb{C})$$

$$a + bi + cj + dk \mapsto \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}$$

מכאן נקבל הצגה מרוכבת דו מימדית של  $G$ . נשים לב שמתקיים  $\text{Span}_{\mathbb{C}}(\rho(G)) = M_2(\mathbb{C})$ , ולכן  $\rho$  אי פריקה. נניח בשלילה כי  $\rho$  מושרית על ידי הצגה חד מימדית של תת חבורה  $K < G$ . אזי  $K$  בהכרח מאינדקס 2. נראה שלא קיימת כזו תת חבורה. תהי  $Q$  חבורת 2 סילוב של  $K$  - מסדר 4. עד כדי הצמדה,  $Q \subseteq E$ . בלי הגבלת הכלליות,  $Q = \{\pm 1, \pm i\}$ . לכן  $\pm i \in K$ , ולכן, על ידי הצמדות ( $K$  נורמלית כי היא מאינדקס 2) נקבל כי  $E \subseteq K$  בסתירה -  $8 \nmid 12$ . לכן קיבנו הצגה אי פריקה שאינה מושרית על ידי הצגה ממימד 1 של תת חבורה. אם כן, ברור כי  $G$  אינה פתירה ביותר. דרכים נוספות לראות את  $G$ :

$$G = \left( \frac{1}{2} \mathbb{Z} \{1, i, j, k\} \right)^*$$

$$G \cong SL_2(\mathbb{F}_3)$$

$$G \cong \text{Aut} \left( \frac{y^2 - y = x^3}{\mathbb{F}_2} \right)$$